

L'OP Assoproli Bari, mediante un capillare monitoraggio realizzato nel suo territorio operativo, nelle attività previste dal nuovo P.O. OCM Olio, offre un quadro aggiornato delle infestazioni dei principali parassiti e patogeni dell'olivo al fine di migliorare la resistenza agli organismi nocivi e ridurre i rischi derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari, incentivando altresì strategie di lotta sostenibili e la riduzione dell'impatto ambientale dell'olivicoltura





REG. (UE) 2021/2115 P.O. OCM Olio anno 2024

Bollettino Fitosanitario

N. 12**Settimana dal** 08/07/2024 **al** 14/07/2024

Il bollettino direttamente sul tuo smartphone!



SCARICALA SUBITO!









Aree Omogenee di Monitoraggio

TIGNOLA - Prays oleae



Area BAT

Andria Barletta Bisceglie Canosa di Puglia Cerignola Corato S. Ferdinando di Puglia Trani Trinitapoli

Area Conca Barese

Bitetto Bitonto Bitritto Giovinazzo Molfetta Palo del Colle Ruvo di Puglia Sannicandro di Bari Terlizzi

Area Sud-Est

Capurso Carovigno Castellana Grotte Castellaneta Fasano Mola di Bari Monopoli Ostuni Triggiano







Catture





Area Omogenea di Monitoraggio: **CONCA BARESE**

Bollettino per il periodo: 15/07/2024 - 21/07/2024

Stadio fenologico dell'olivo: Indurimento nocciolo

Rilevazioni medie dell'area omogenea

Infestazione attiva **Indicazione** Infestazione sotto soglia di intervento

tecnica 0,95 0,65 10% SOGLIA DI INTERVENTO (Media/Trappola) (% Media/Campo Spia)

Dettaglio rilevazioni per comune

| COMUNE: | CATTURE: | INFESTAZIONE ATTIVA: | INDICAZIONE TECNICA: |
|---------------------|----------|-------------------------|---|
| ВІТЕТТО | 1,83 | 0 | Infestazione sotto soglia di intervento |
| BITONTO COSTA | 0 | 0 | Infestazione sotto soglia di intervento |
| BITONTO MURGIA | 0,6 | 0 | Infestazione sotto soglia di intervento |
| BITRITTO | 2,33 | 0 | Infestazione sotto soglia di intervento |
| GIOVINAZZO | 0 | 0 | Infestazione sotto soglia di intervento |
| MOLFETTA | 0,17 | 0 | Infestazione sotto soglia di intervento |
| PALO DEL COLLE | 0,44 | 6,67 | Infestazione sotto soglia di intervento |
| RUVO DI PUGLIA | 1,1 | 0 | Infestazione sotto soglia di intervento |
| SANNICANDRO DI BARI | 2 | 0 | Infestazione sotto soglia di intervento |
| TERLIZZI | 0 | 0 | Infestazione sotto soglia di intervento |





Suggerimenti fitosanitari

Area omogenea di monitoraggio CONCA BARESE:

NEL COMPRENSORIO, L'ATTIVITA' DELLA TIGNOLA DELL'OLIVO RISULTA IN DIMINUZIONE RISPETTO ALLA SCORSA SETTIMANA. DAL MONITORAGGIO EFFETTUATO IN PIENO CAMPO, GRAZIE ALLE TRAPPOLE INSTALLATE NEI CAMPI-SPIA, SI REGISTRA - RELATIVAMENTE AI VALORI "STORICI" - UN NUMERO IN DIMINUZIONE DI CATTURE DI ADULTI DELLA GENERAZIONE ANTOFAGA DELLA PRAYS OLEAE: IL QUADRO GENERALE PARLA DI UNA MEDIA DI POCO MENO DI 1 INDIVIDUO PER TRAPPOLA, CON PUNTE DI 4 UNITA' NEI CAMPI ALLESTITI IN AGRO DI BITETTO ALLA C.DA MACCHIA BALDINA, IN AGRO DI BITRITTO ALLA VIA BITETTO E IN AGRO DI BITONTO (ZONA MURGIA) ALLA C.DA TORRE DI REGNA.

DALLA DISAMINA AL MICROSCOPIO STEREOSCOPICO DELLE OLIVINE È STATO RILEVATO UN NUMERO IN DIMINUZIONE DI UOVA E LARVE DESTINATE A DAR ORIGINE ALLA TERZA GENERAZIONE, QUELLA CARPOFAGA: LA MEDIA GENERALE È INFATTI PARI ALLO 0,65% CON UNICA PUNTA DEL 9% IN AGRO DI PALO DEL COLLE ALLA CONTRADA MONTE LONTANO, AL DI SOTTO DELLA SOGLIA DI INTERVENTO FISSATA AL 10%.

ALLA LUCE DI QUANTO RILEVATO, NELL'AREALE DI RIFERIMENTO NON SI RITIENE GIUSTIFICATA L'ESECUZIONE DI UN TRATTAMENTO FITOSANITARIO.

SI INVITANO GLI OLIVICOLTORI INTERESSATI A RECARSI PRESSO LE UNITA' OPERATIVE PERIFERICHE DI RIFERIMENTO DOVE I CONSULENTI ASSOPROLI BARI SONO A COMPLETA DISPOSIZIONE PER ILLUSTRARE PIU' DETTAGLIATAMENTE LA SITUAZIONE FITOSANITARIA IN CORSO.









Meteo

Area Omogenea di Monitoraggio:

CONCA BARESE











